


# Flusseeschwalbe

*Sterna hirundo*

Engl.: Common Tern



Heimat:

Küstenbereiche Europas, teilweise im Binnenland; Asien, N-Amerika

Überwinterung:

An der afrikanischen Küste unterhalb der Sahara

Brutzeit:

Mai / Juni

Gelege:

2 bis 3 Eier

Brutdauer:

20 bis 26 Tage

Nestlingszeit:

Platzhocker, mit 23 bis 27 Tagen flugfähig



oben und unten:

Einblick in eine Brutkolonie im Binnenland. Auf einer Insel in einer noch bewirtschafteten Sandgrube finden seit einigen Jahren erfolgreiche Bruten statt.

Rechts und Mitte:

An der Eidermündung befindet sich eine Kolonie, in der zusätzlich zu den hier gezeigten Flusseeschwalben einige Paare Küstenseeschwalben brüten.

An den Küsten Europas ist die Flusseeschwalbe die am stärksten vertretene Seeschwalbenart. Im Binnenland sind die Vögel nur an Stellen anzutreffen, an denen der Druck durch die Freizeitaktivitäten nicht zu hoch ist. Durch Bereitstellung von Brutflößen wird versucht, die Vögel an Seen zu halten, in denen keine Sandinseln vorhanden sind. Junge Flusseeschwalben bleiben zunächst in Nestnähe oder suchen Deckung in der niedrigen Vegetation, kommen den Futter bringenden Altvögel jedoch entgegen.

© Eckhard Lietzow, [www.lietzow-naturfotografie.de](http://www.lietzow-naturfotografie.de)