


# Hohltaube

*Columba oenas*  
Engl.: Stock Dove



Heimat:  
Europa ohne nördliche Bereiche, im Osten bis Sibirien, Nord-Afrika

Überwinterung:  
Nördliche und mitteleuropäische Vögel ziehen nach Südwesten.

Brutzeit:  
März / April, oft 3 Jahresbruten

Gelege:  
2 Eier

Brutdauer:  
16 bis 18 Tage

Nestlingszeit:  
18 bis 28 Tage, je nach Jahreszeit



Hohltauben sind von Ringeltauben gut zu unterscheiden, ihnen fehlt das weiße Nackenband und der weiße Flügelbug



Hohltauben sind bei uns wesentlich seltener zu sehen als die allgegenwärtigen Ringeltauben. Ihr bevorzugter Lebensraum liegt in Laub- und Mischwäldern. Als Höhlenbrüter benötigen die Tauben relativ große Baumhöhlen, wo diese nicht vorhanden sind, werden auch Felshöhlen oder sogar Kaninchenbauten genutzt. Hauptnahrung sind verschiedene Samen von Wildkräutern, Früchte und Beeren.



© Eckhard Lietzow, [www.lietzow-naturfotografie.de](http://www.lietzow-naturfotografie.de)