


Kohlmeise

Parus major

Engl.: Great Tit



Heimat:
Europa ohne nördlichste Bereiche,
Asien bis Japan, Nord-Afrika

Überwinterung:
Mitteleuropäische Kohlmeisen sind
Jahresvögel, Nordeuropäer ziehen
südwestwärts

Brutzeit:
März bis Mai, oft 2 Jahresbruten

Gelege:
8 bis 12 Eier

Brutdauer:
13 bis 14 Tage

Nestlingszeit:
18 bis 21 Tage



oben: Männchen, zu erkennen am durchgehenden Bauchstreif.

Alle anderen Fotos: Weibchen, der schwarze Bauchstreif ist mehr oder weniger unterbrochen.

Obwohl Kohlmeisen bevorzugt in Laub- und Mischwäldern leben, sind sie sehr anpassungsfähig und kommen in nahezu allen Landschaften vor, besonders in Parks und Gärten. An den Futterstellen sind sie im Winter regelmäßige Gäste. Da die Hauptnahrung dieser Vögel aus Insekten, Raupen, Knospen und Beeren besteht, sollte entsprechendes Futter zur Verfügung gestellt werden (Fettfutter und evtl. Mehlwürmer).



© Eckhard Lietzow, www.lietzow-naturfotografie.de