


Kuhreiher

Bubulcus ibis

Engl.: Cattle Egret



Heimat:
Südliches Europa, Vorderasien,
Afrika, Süd- und Mittelamerika

Überwinterung:
Europäische Vögel überwintern in
Spanien und Nord-Afrika

Brutzeit:
April bis Juni

Gelege:
4 bis 5 Eier

Brutdauer:
22 bis 26 Tage

Nestlingszeit:
20 Tage, danach 10 Tage Ästling



Kaum ein anderer Reiher hat es verstanden, sich über weite Teile der Welt so zu verbreiten wie der Kuhreiher. In einigen Gegenden wird davon ausgegangen, dass heute stabile Populationen aus entflohenen Volierenvögeln entstanden sind, so wahrscheinlich auch in Europa.

Der Kuhreiher ist weniger wassergebunden als die meisten anderen Reiherarten. Seine Nahrung (Insekten, Würmer, kleine Reptilien und Säuger) sucht er Feldern, Weiden und Überschwemmungsflächen, Fische werden nur höchst selten verzehrt. Gebrütet wird vorwiegend in Kolonien, auch zusammen mit anderen Reiherarten.

© Eckhard Lietzow
www.lietzow-naturfotografie.de



Orangefärbung im Prachtkleid (Volierenaufnahme)