


Schwanzmeise

Aegithalos caudatus
Engl.: Long-tailed Tit



Heimat:
Europa ohne äußersten Norden, Teile
Asiens


Überwinterung:
Nördlich Vögel ziehen nach Mittel-
Europa, bei uns sind die Vögel
Standvögel oder Kurzstreckenzieher

Brutzeit:
März bis April, gelegentlich 2
Jahresbruten

Gelege:
8 bis 12 Eier

Brutdauer:
12 bis 14 Tage

Nestlingszeit:
14 bis 18 Tage



Im Winter kommen Schwanzmeisen gern an die Futterstellen



In Europa unterscheidet man mehr als 10 Unterarten der Schwanzmeise. Die Vögel bevorzugen während der Brutzeit als Lebensraum feuchte Waldgebiete mit Unterholz, sind aber auch in Parks, an Ortsrändern und auf Friedhöfen zu finden. Außerhalb der Brutzeit streifen sie in Gruppen umher und haben teilweise eine recht geringe Fluchtdistanz, sind aber immer in Bewegung. Besonders in der kälteren Jahreszeit bilden sich Schlafgemeinschaften. Als Nahrung bevorzugen die Vögel möglichst kleine Insekten, pflanzlich Nahrung spielt eine untergeordnete Rolle.

© Eckhard Lietzow, www.lietzow-naturfotografie.de

